

Protect Plus Fresh Bait (Pasta)

%0,005 Bromadiolone + %0,002 Bitrex

**Aktif maddesi
Bromadiolone
Avrupa Birliği'nde
"Babolna"
tarafından
ruhsatlandırılmıştır.**



Aktif Madde (Bromadiolone) Akut oral LD₅₀: Dişi farelerde 1,12 mg/kg


KULLANMA ŞEKLİ

Sıçanların ölümü 6-9. günler arasında, farelerin ölümü 10-22. günler arasında gerçekleşir. Pasta halindeki ürün, kapalı alanlardaki uygun yerlere, fare ve sıçanların yaşam alanlarının, gezinme ve beslenme yerlerinin yakınlarına, hayvan barınaklarından ve yerleşim alanlarından uzakta olmak üzere akarsu civarlarına "güvenlik uyarısı içeren" besleme kutuları içine konmalıdır.

Bulaşmanın yoğunluğuna veya alanın büyüklüğüne bağlı olarak besleme kutularına fareler için 2-4 adet ve sıçanlar için 8-10 adet konmalıdır. Beslenme kutularını fareler için 5 m, sıçanlar için 10 m aralıklarla yerleştirmelidir. Ürünü her 7-10 günde bir düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve eğer tepsi boşsa yeni ürün koyulmalıdır. Kirlenmiş yemler hemen kaldırılmalı ve yerine yeni ürün konmalıdır.

UYGULAMA ORANLARI

ZARARLI TÜRÜ YAŞAM EVRESİ	UYGULAMA ALANI VE ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
FARE ERGİN	KAPALI ALAN VE MESKEN ÇEVRESİ	2-4 adet 5 m aralıklarla
SIÇAN ERGİN	KAPALI ALAN VE MESKEN ÇEVRESİ	8-10 adet 10 m aralıklarla



 **Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş.**

Maslak Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No.1 Kat 18 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0(212) 290 25 60 (pbx) Fax: 0(212) 290 25 75-76